

| Dosis de acetaminophen para dar cada 4-6 horas, pro edad o por peso | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
| 1-3 meses 6-11 lbs (3-6kg) | 1/2 gotero |  | |
| 4-11 meses 12-17 lbs (6-9 kg) | 1/2 cucharada de jarabe |  |  |
| 13-23 meses 18-23 lbs (9-12kg) | 3/4 cucharada de jarabe |  |  |
| 2-3 años 24-35 lbs (12-25 kg) | 2 tabletas masticables (80mg) |  |  |
| 4-5 años 36-47 lbs (20-25kg) | 3 pastillas masticables (80 mg) |  |  |



¿Cuánta Medicina (acetaminophen) le Deberia dar a Mi Niño?

No tarde en contactar a su médico o a la enfermera del Health Department si tiene preguntas o dudas.

Panhandle Health District oficinas listas para servile en cada uno de los cinco condados del Norte de Idaho.

Kootenai County
8500 N. Atlas Road
Hayden ID 83835
208 415-5100

Bonner County
1020 Michigan
Sandpoint ID 83864
208 263-5159


Boundary County
7402 Caribou
Bonners Ferry ID 83805
208 267-5558

Benewah County
711 Jefferson
St. Maries ID 83861
208 245-4556

Shoshone County
114 W Riverside
Kellogg ID 83837
208 786-7474



**DESPUES DE
LAS
VACUNAS**



Panhandle Health District
Healthy People in
Healthy Communities
www2.state.id.us/phd1

Después de las Vacunas

Por las primeras 48 horas estos síntomas son comunes

- Temperatura media tomada rectalmente bajo 101° F. Tome acetaminophen (Tylenol, Tempra, Panadol) de acuerdo al póster de la edad/peso.
- NO TOME ASPIRINA.
- Tome extra fluidos como agua y jugos.
- Bañe a su niño en unos cuantos centímetros de agua tibia (no fría). No use alcohol en el agua. Vista a su niño con ropa delgada, no lo arroje.
- Irritación o hinchado en la parte de la inyección—ponga una toalla limpia y fría. Si la hinchazón continúa más de 24 horas, use una toalla caliente por 15 min. cada 2 o 3 horas.
- Su niño muestra irritabilidad—ofrézcale estar cómodo. Dándole regularmente acetaminophen puede ayudar a la irritabilidad y el desconforto.

Cuando Llamar Al Doctor o a Panhandle Health District

- Si su niño tiene temperatura mayor de 105°F (o 104°F oral o bajo del brazo).
- Si su niño está pálido o sin energía.
- Si su niño llora por más de tres horas sin parar.
- Si su niño tiene un extraño lloriqueo o diferente (sonido agudo).
- Si su niño tiene escalofríos o está moviéndose.
- Si está preocupada por alguna razón después de las vacunas.

VACUNAS DADAS & Y LOS EFECTOS SECUNDARIOS

Vacunas Inactivas

- **DTaP** (difteria, tétanos, pertusis): Fiebre e hinchazón en el lugar afectado por 48 horas.
- **DT or Td** (difteria-tétanos a edad de 7 o tétanos-difteria después de 7): Fiebre/hinchazón en área afectada.
- **Hib/HBOC** (Influenza): Los efectos son raros, fiebre ocasionalmente/dolor.
- **IPV** (virus de polio inactivado): Se tolera bien, raramente hay reacción.
- **Prevnar** (*Conjugada neumonía*): Reacciones locales 10-20%; fiebre, músculos adoloridos 5%-24%.

- **Hepatitis B:** Los efectos son raros, algo de dolor local.
- **Hepatitis A:** Dolor local, irritación, hinchazón en 20%-50%; fiebre, fatiga <10%, dolor de cabeza 5-15%.
- **Meningococcal:** Hasta 50% tienen enrojecimiento, dolor en el sitio de inyección. Un pequeño porcentaje puede tener fiebre.

Vacunas con Virus Activas

- **MMR** (*Sarampión, paperas y rubéola*): Fiebre es común, puede ser 103° F comenzando 7-10 días después de las vacunas, durando 1-2 días.
- **Sarampión:** No-contagioso, pasadero, irritación 7-10 días después de las vacunas en 5% de la 1ª dosis.
- **Rubéola:** No-contagiosa, pasadera, irritación-10 días después de las vacunas, dolor de músculos o hinchazón, pequeña hinchazón del cuello.
- **Paperas:** Raramente, pocas fibras y glándulas hinchadas detrás de las orejas han sido reportadas.
- **Varicela:** (Viruela) dolor local, irritación o hinchazón una irritación como la varicela ocurre en 4%-6% con una generalización de 5 lesiones.